

SINGESTAR® COMPRIMIDOS

Anticoncepcional para cães e gatos

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada comprimido de 280 mg contém:

Acetato de megestrol.....20 mg

Excipiente q.s.p.....280 mg

PROPRIEDADES:

O princípio ativo de SINGESTAR® COMPRIMIDOS é o acetato de megestrol, um poderoso progestágeno oral, amplamente experimentado em cães e gatos, com alta margem de segurança. O acetato do megestrol atua inibindo a secreção das gonadotrofinas hipofisárias e possui, além disso, acentuados efeitos anti-estrogênicos e anti-androgênicos.

Estas propriedades fazem de SINGESTAR® COMPRIMIDOS não só um anticoncepcional eficaz, mas também um produto de múltiplas aplicações em Medicina Veterinária.

INDICAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

SINGESTAR® COMPRIMIDOS deve ser administrado por via oral.

• Para evitar ou anular o estro (cio) da cadela:

1. Posologia normal: 1 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 8 dias. Os comprimidos devem ser administrados assim que se apresentarem as características do cio: inflamação da vulva e sangramento vaginal. As manifestações do cio (atração dos machos e sangramento vaginal) desaparecem entre 2 a 3 dias após o início da medicação.

2. Posologia prolongada: em alguns casos, pode ser vantajoso administrar 1 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 4 dias e logo continuar com 1/4 de comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 16 dias. Isto é aconselhável nos seguintes casos: cadelas com antecedentes de falsa gravidez (pseudociese); cadelas cujas manifestações de cio não são muito evidentes (cios silenciosos ou pouco aparentes); cadelas que acasalam e mostram tendências a sincronizar seus cios e também, quando se deseja evitar o primeiro cio.

• Para atrasar ou adiar o estro (cio) da cadela:

O atraso ou adiantamento do estro (cio) pode ser benéfico nas seguintes circunstâncias: feiras; exposições; hospedagem temporária de fêmeas juntamente com machos (pensões, canis); quando se deseja alcançar um espaço maior entre as ninhadas; nas fêmeas destinadas à reprodução, etc.

As doses recomendadas para atrasar o estro (cio) são as seguintes:

1. Posologia normal: 1/4 de comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia pelo período de 30 ou 40 dias. O tratamento deve ser iniciado 15 dias antes da data em que se deseja obter o efeito.

2. Posologia prolongada: 1/4 de comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia durante 30 a 40 dias, e logo a seguir 1/4 de comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, 2 vezes por semana, durante um período de 4 meses. Este tipo de posologia permite manter a cadela sem cios, por um período de 8 a 10 meses.

• Falsa gravidez na cadela (Pseudociese):

1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia durante 8 dias.

Com este tratamento desaparecem, em mais de 90% dos casos, as manifestações nervosas, o desenvolvimento mamário e a secreção láctea dentro dos primeiros 2 a 5 dias.

• Para evitar ou anular o estro (cio) da gata:

1/2 comprimido/dia durante 7 dias, continuando logo com 1/4 de comprimido, 1 ou 2 vezes por semana. O tratamento deve ser iniciado imediatamente após se perceber as manifestações características da época do cio ou chamada (as gatas miam de forma estridente, continuamente levantam as patas traseira e colocam o rabo nas costas, dando voltas sobre si mesmas).

• Atrasar ou adiar o estro (cio) na gata:

1. Durante a temporada de cria: 1/4 de comprimido por gata/dia, durante um período máximo de 2 meses. Os comprimidos devem ser administrados quando a gata estiver na temporada de cria, porém fora da época do cio ou chamada.

2. Fora da temporada de cria: 1/4 de comprimido por gata, uma vez por semana, durante um período

máximo de 2 meses. Os comprimidos devem ser administrados quando a gata se encontra fora da temporada de cria (período de repouso sexual).

• **Hipersexualidade do macho:**

A dose inicial deve ser de 1 ou 2 comprimidos, para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 7 dias. Em seguida, 1/2 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo, durante 14 dias. Com este tratamento desaparecem em cerca de 80% dos casos, os problemas que se apresentam com maior frequência na hipersexualidade do cão: agressividade; delimitação de seu espaço com a urina; atitude de montar em pessoas e em outros cães; ficar vagando a esmo; intranquilidade; perda de peso, etc. Em alguns casos, deve-se administrar uma dose de manutenção de 1/2 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo, 1 ou 2 vezes por semana.

• **Adenoma das glândulas perianais:** 1 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia durante 20 dias ou mais. Se for feita a extirpação cirúrgica é aconselhável prescrever uma dose de manutenção de 1/2 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo, 1 ou 2 vezes por semana, para evitar recaídas.

• **Hipertrofia prostática no cão:** 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo/dia, continuando a seguir com 1/2 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo, 2 vezes por semana.

• **Tumores estrógeno dependentes na cadela:** 1 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia durante 5 dias, continuando a seguir com 1/2 comprimido para cada 10kg de peso corpóreo/dia, durante 10 dias ou mais.

• **Hipersexualidade do gato:** 1/2 comprimido/gato/dia durante 7 dias, continuando a seguir com 1/4 de comprimido/dia por animal, durante 14 dias. Os problemas mais comuns apresentados na hipersexualidade dos gatos (jatos de urina; excitabilidade; vagar a esmo; miados estridentes e contínuos) desaparecem em cerca de 80% dos casos. Pode-se também ser indicada uma dose de manutenção de 1/4 comprimido/gato, 1 ou 2 vezes por semana.

• **Dermatite miliar felina:** 1/2 comprimido diário por animal durante 7 dias até ser alcançada a regressão do quadro clínico. Deve-se continuar logo após com uma dose de 1/4 de comprimido por animal, 2 vezes por semana, até a cura total. É aconselhável prescrever uma dose de manutenção de 1/4 de comprimido/animal, a cada 15 dias, para evitar recaídas.

• **Granuloma eosinofílico dos gatos:** 1/2 comprimido por animal/dia, em média, até que a lesão comece a regredir, continuando a seguir com 1/2 comprimido por animal, 1 vez por semana até a regressão total.

CONTRA-INDICAÇÕES, EFEITOS ADVERSOS E PRECAUÇÕES:

O acetato de megestrol pertence ao grupo dos progestágenos, sendo o que menos efeitos colaterais produz. Sem dúvida, como todo progestágeno, é capaz de induzir tanto na cadela, como na gata, diversas alterações patológicas do útero (hiperplasia cística do endométrio, mucometra e/ou piometra).

O aparecimento destes sintomas, não depende unicamente da dose, mas também, da duração do tratamento e da sensibilidade própria de cada animal.

Como regra geral, não é aconselhável sua administração em animais que tenham sofrido de problemas uterinos ou para animais impúberes.

Os animais tratados continuamente com SINGESTAR® COMPRIMIDOS deverão ser submetidos periodicamente a uma revisão clínica, a fim de detectar o aparecimento de enfermidades uterinas.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 a 35 °C e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Blister com 8 oitos comprimidos de 280 mg cada, acondicionados em cartucho.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.375 em 26/07/93.