

OTOSYN[®] Solução Dermatológica (Gotas)

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Tiabendazol..... | 4,0 g |
| Neomicina (sulfato) | 0,288 g |
| Acetonida de Triamcinolona..... | 0,100 g |
| Veículo q.s.p..... | 100,0 mL |

DERMOTIC[®] é uma solução a base de Tiabendazol, Sulfato de Neomicina e Acetonida de triamcinolona, em excipiente não oleoso a base anidra de pH ácido.

Longos estudos realizados nos últimos anos demonstraram que o tiabendazol é um produto fungicida de largo espectro, particularmente eficaz contra os dermatófitos mais importantes na etiologia das dermatites e otites de cães e gatos (*Microsporum sp* e *Trichophyton sp*). O sulfato de neomicina é um antibiótico de amplo espectro, eficaz contra o *Staphylococcus aureus* e *Proteus vulgaris*, principais agentes etiológicos das dermatites e otites externas.

A incorporação na fórmula de DERMOTIC[®] da acetonida de triamcinolona, acarreta a diminuição dos sintomas inflamatórios, dor e/ou prurido que podem acompanhar as dermatites e otites externas. A presença de flúor, na molécula de acetonida de triamcinolona, diminui a capacidade de absorção através da pele, fazendo deste antiinflamatório, o composto de eleição para uso tópico.

INDICAÇÕES:

DERMOTIC[®] é indicado nas dermatites e otites externas dos cães e gatos causadas por agentes bacterianos como: *Staphylococcus aureus*, *Proteus vulgaris* e *Pseudomonas aeruginosa* e por agentes micóticos como *Microsporum sp*, *Trichophyton sp*, *Candida albicans* e *Malassezia sp*.

POSOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO:

- **Otite externa:** Antes da aplicação de DERMOTIC[®] remover a cera e/ou material purulento do canal auditivo. Instilar 4 a 8 gotas no canal auditivo, com o próprio frasco conta-gotas, 2 vezes ao dia.
- **Dermatite Cutânea:** para uma lesão de 2 cm de diâmetro, aplicar 4 a 6 gotas aproximadamente, 2 vezes ao dia (a dose dependerá da extensão da lesão), tendo o cuidado de manter a superfície afetada umedecida com DERMOTIC[®].

Duração do Tratamento: em todos os casos, o tratamento deve prolongar-se até 2 a 3 dias após o desaparecimento total dos sintomas.

CONTRA-INDICAÇÕES:

Não há contra-indicações nas doses recomendadas. Se excepcionalmente ocorrer alguma reação alérgica local, suspender o tratamento.

PRECAUÇÕES:

A aplicação nas áreas muito lesadas (feridas ou arranhões produzidos pelo ato de coçar do animal) pode provocar uma leve irritação, que desaparece em 2 ou 5 minutos.

ADVERTÊNCIA:

Evitar o contato com os olhos.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, à temperatura entre 15 e 25°C, ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco plástico tipo conta-gotas contendo 15 mL.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.724 em 09/02/99.