

## **KURAMICINA L.A.®**

### **Oxitetraciclina anfótera de ação prolongada**

#### USO VETERINÁRIO

#### **FÓRMULA:**

Cada 100 mL contém:

Oxitetraciclina base anfótera ..... 20,00 mg  
Veículo q.s.p ..... 100,00 mL

KURAMICINA® L.A. é uma solução pronta para uso, de ação prolongada, do antibiótico oxitetraciclina, de amplo espectro. Devido à sua formulação especial e potência, KURAMICINA® L.A. produz níveis terapêuticos eficazes por 3 a 5 dias, facilitando o tratamento dos animais com um mínimo de manejo.

#### **INDICAÇÕES:**

KURAMICINA® L.A. é indicado para o tratamento de processos infecciosos causados por uma grande variedade de bactérias, tanto Gram-positivas como Gram-negativas, micoplasmas, rickettsias, clamídias do grupo linfogranuloma-psitacose, alguns protozoários e fungos patogênicos. É utilizado nas espécies bovina, ovina e suína.

As principais indicações são:

- **Bovinos:** Actinobacilose, anaplasmose, artrite infecciosa (*Streptococcus spp.*), carbúnculo sintomático, dermatofiloses, doenças respiratórias (*Pasteurella spp.*), gabarro, leptospirose, mastite (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*), metrite (*Streptococcus spp.*, *Escherichia coli*), septicemia hemorrágica, febre do transporte (*Pasteurella spp.*).
- **Ovinos:** Aborto enzoótico (*Chlamydia psitaci*), artrite infecciosa (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*), doenças respiratórias (*Pasteurella spp.*), enterites bacterianas (*Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Escherichia coli*), necrobacilose, septicemia hemorrágica (*Pasteurella spp.*).
- **Suínos:** Artrite infecciosa, erisipela, leptospirose, necrobacilose, pasteurelose, síndrome MMA (Mastite, Metrite, Agalaxia), diarreia dos leitões lactentes (colibacilose), rinite atrófica.

#### **ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:**

A dose recomendada é de 1 mL para cada 10 kg de peso corpóreo para todas as espécies animais (200 mg de oxitetraciclina para cada 10 kg). Em leitões com menos de 10 kg de peso corpóreo, a dose é de 1 mL por animal. Aplica-se a injeção por via intramuscular, nas grandes massas carnosas como tábua do pescoço, garupa ou coxa. Em leitões de até 10 kg aplica-se por via subcutânea, atrás do pavilhão da orelha. Injeções volumosas devem ser divididas e aplicadas em diferentes pontos. Não se devem exceder os seguintes volumes **por ponto**: bovinos 20 mL, ovinos 5 mL, suínos 10 mL.

Na maioria das vezes basta uma única aplicação. Não obstante, alguns casos requerem que se repita a injeção, como por exemplo:

- Tratamento de anaplasmose: repetir aos 7 dias;
- Síndrome MMA das porcas: repetir após 3-4 dias, associado ou não à medicações complementares. Aplicar no início, ou logo depois do parto;
- Recomenda-se fazer os tratamentos sob orientação de um Médico Veterinário.

#### **CONTRA INDICAÇÕES:**

- Não aplicar em animais hipersensíveis à oxitetraciclina;
- Não fazer tratamentos conjugados com penicilina;
- Não aplicar em casos com histórico ou com antibiogramas que evidenciem cepas de bactérias resistentes às tetraciclina.

#### **EFEITOS ADVERSOS:**

Excepcionalmente podem ocorrer reações alérgicas ou anafiláticas em animais hipersensíveis. Aos primeiros sintomas, administrar epinefrina (adrenalina) sob a orientação do Médico Veterinário. Também pode ocorrer hemoglobinúria passageira, sem significado clínico. Pequenas reações inflamatórias no local da injeção, em geral desaparecem em poucos dias, sem tratamento.

**PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:**

Suspender a medicação 30 dias antes do abate em animais destinados ao consumo humano. Não aplicar em fêmeas leiteiras em lactação.

**CONSERVAÇÃO:**

Conservar em local seco e fresco e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

**APRESENTAÇÃO:**

Frasco-ampola de vidro contendo 20, 40, 50 ou 100 mL.

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 4.043 em 22/07/92.