

BASKEN® SUSPENSÃO PLUS 5

Antihelmíntico de amplo espectro para cães e gatos

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Pamoato de Pirantel	7,25 g
Pamoato de Oxantel	7,00 g
Praziquantel	2,5 g
Veículo q.s.p	100 mL

PROPRIEDADES:

BASKEN® SUSPENSÃO PLUS 5 é uma apresentação original e exclusiva de um antiparasitário que cobre o espectro total dos vermes (nematódeos e cestódeos), que atacam cães e gatos baseado na combinação de três drogas específicas e de máximo poder vermífida para seus respectivos espectros: Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel e Praziquantel. Essa associação possui como característica própria, eficácia parasiticida, inocuidade e tratamento simplificado em dose única.

BASKEN® SUSPENSÃO PLUS 5 não é somente eficaz contra parasitos adultos, mas também contra “as formas imaturas” das tênias e larvas de nematódeos. Esta última propriedade evita os danos que a migração larval de alguns parasitas produzem aos pulmões e fígado.

INDICAÇÕES:

Parasitoses provocadas por: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncynaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisciformis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia taeniformis*, *Taenia hidatigena* e todos os tipos de cestódeos que parasitam cães a partir de 21 dias de vida, e gatos a partir de 42 dias de vida.

É indicado para machos reprodutores, fêmeas em qualquer estágio da gestação e fêmeas lactantes que tiveram filhotes há mais de 21 dias.

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

Via oral.

A dose para cães e gatos é de 1 mL de suspensão para cada 5 kg de peso corpóreo.

Usar a seguinte escala de doses:

- **Até 5 kg de peso corpóreo: 1 mL de suspensão;**
- **Mais de 5 kg de peso corpóreo: 1 mL para cada 5 kg de peso ou fração de kg;**
- Não requer jejum prévio ou posterior;
- Pode ser administrado diretamente ao animal com a ajuda do dosador oral, ou misturado a uma pequena porção de alimento (garantir a ingestão completa do medicamento);
- O sabor agradável de BASKEN® SUSPENSÃO PLUS 5 facilita a sua administração;
- A margem de segurança é de 30 vezes a dose recomendada;
- Não produz efeitos colaterais indesejáveis;
- É compatível com tratamentos paralelos: vacinações, aplicação de ectoparasiticidas ou coleiras anti-pulgas;
- Normalmente uma única dose é suficiente para alcançar a desparasitação desejada.

OBS: Nos casos excepcionais de “Trichuriases” sérias, é conveniente repetir o tratamento por 3 dias consecutivos. É aconselhável aplicar tratamento anti-pulgas no animal e no ambiente no mesmo período de administração deste produto com o intuito de evitar a reinfestação por *Dipylidium caninum*.

CONTRA INDICAÇÕES:

Não administrar em cães com idade inferior a 21 dias e em gatos com idade inferior a 42 dias de vida.

NOTA:

Apesar do produto apresentar-se como uma solução de alta estabilidade, para garantir a dosificação correta, deve-se agitar o frasco para que se tenha uma homogeneização completa dos princípios ativos. Não administrar concomitantemente com outras drogas colinérgicas como o levamisol.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, à temperatura entre 4 e 35 °C, ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Frasco de plástico, com dosador oral, contendo 20 e 50 mL.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.899 em 30/06/04.