

BASKEN® PLUS 40

Antihelmíntico de amplo espectro de ação para cães e gatos

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada comprimido de 1.100 mg contém:

Pamoato de pirantel (equivalente a 12,5 mg de base).....	144,12 mg
Pamoato de oxantel (equivalente a 12,5 mg de base).....	94,88 mg
Praziquantel.....	24,96 mg
Excipiente q.s.p.....	1.100 mg

PROPRIEDADES:

BASKEN® PLUS 40 é uma apresentação original e exclusiva de um antiparasitário que cobre o espectro total dos vermes que atacam cães e gatos (nematódeos e cestódeos), baseado na combinação de três drogas específicas e de máximo poder vermífida para os seus respectivos espectros: Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel e Praziquantel.

Essa associação possui como característica própria, alta eficácia parasiticida, extrema inocuidade e tratamento simplificado em dose única.

BASKEN® PLUS 40 não é somente eficaz contra parasitas adultos, mas também contra as formas imaturas das tênias e larvas de nematódeos, as quais BASKEN® PLUS 40 mata a medida que ocorre a eclosão dos ovos. Essa última propriedade evita os danos que a migração larval provoca nos pulmões e no fígado.

INDICAÇÕES:

Parasitoses provocadas por: *Toxocara canis*, *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncynaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisciformis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia taeniformis*, *Taenia hidatigena* e todos os outros tipos de cestódeos que parasitam cães e gatos. É indicado para filhotes de cães e gatos a partir de 3 semanas de vida.

É indicado para machos reprodutores, fêmeas em qualquer estágio da gestação e fêmeas lactantes que tiveram filhotes há mais de 20 dias.

BASKEN® PLUS 40 é uma apresentação especialmente indicada para cães e gatos de grande porte, permitindo a redução do número de comprimidos a administrar em função da maior concentração de princípios ativos que possui.

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

Via oral

Cães e Gatos: 1 comprimido para cada 10 kg de peso corpóreo.

- Uma dose única é suficiente para alcançar a desparasitação desejada;
- Não requer jejum prévio ou posterior. Pode ser misturado ao alimento, controlando assim a ingestão completa do medicamento;
- A margem de segurança é de até 30 vezes a dose recomendada;
- Não produz efeitos colaterais indesejáveis;
- É compatível com tratamentos paralelos, vacinações, aplicações de ectoparasiticidas ou coleiras anti-pulgas.

OBS: Nos casos excepcionais de "Trichuriases" sérias, é conveniente repetir o tratamento por 3 dias consecutivos.

CONTRA INDICAÇÕES:

Não apresenta.

CONSERVAÇÃO:

Conservar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 e 35° C e ao abrigo da luz solar direta. Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho contendo 1 blister com 4 comprimidos de 1.100 mg cada.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.380 em 27/07/93.