

BACTROVET® PRATA AM

Larvicida, bernicida, repelente, cicatrizante, anti-séptico, alta aderência, hemostático

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada 100 g de concentrado contém:

Sulfadiazina Prata.....	0,1 g
Alumínio.....	5,0 g
DDVP.....	1,6 g
Cipermetrina.....	0,4 g
Excipiente q.s.p.....	100,0 g

INDICAÇÕES:

Bactrovet® Prata AM é indicado para bovinos de todas as idades, inclusive para recém-nascidos.

- Age como larvicida nas feridas infestadas, com rápida cicatrização;
- Aplicado de forma rotineira nas feridas acidentais ou cirúrgicas (castração, descorna, cesariana, etc...), elimina o sangramento das mesmas (efeitos adstringente e hemostático), formando uma película protetora que evita a infecção;
- Seu efeito repelente impede que as feridas tratadas, sejam atacadas pelas moscas causadoras das miíases;
- Devido à sua alta penetração e persistência Bactrovet® Prata AM é excelente na cura de umbigos;
- A válvula multidirecional de Bactrovet® Prata AM permite tratar feridas de difícil acesso, pela manobra da embalagem em qualquer direção desejada.

MODO DE USAR:

Agitar energicamente o frasco antes de cada aplicação. Colocar o frasco a uma distância de aproximadamente 10 cm da ferida ou área infestada (bicheiras). Pressionar a válvula e vaporizar abundantemente garantindo a penetração do produto na ferida. Aplicar também ao redor da mesma pois a coloração prateada característica identificará o animal tratado.

- **Tratamento de miíases:** introduzir cuidadosamente o produto nas cavidades onde se alojam as larvas da bicheira. Nos casos de miíases muito graves, convém proceder a retirada das larvas das áreas afetadas e limpá-la antes de aplicar o produto.
- **Prevenção das miíases e cicatrizante:** aplicar diretamente sobre toda a ferida recente causada por acidente ou por castração, descorna, etc.

POSOLOGIA:

- Preventivo: uma única aplicação
- Curativo: uma aplicação diária geralmente por 4 a 5 dias.

PRECAUÇÕES:

Inflamável: não perfure o vasilhame mesmo vazio. Não jogue no fogo ou incinerador. Não utilizar o produto próximo às chamas; Não beber, fumar ou comer durante a aplicação; Lavar as mãos após a aplicação; Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos; Não guardar ou aplicar o produto junto a alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos; Aplicar o produto a favor do vento para não atingir o operador; Proibido o reaproveitamento da embalagem. Descartar de forma segura e que evite a contaminação do meio ambiente; Conservar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 e 35° C e ao abrigo da luz solar direta.

ANTÍDOTO:

No caso de intoxicação aplicar tratamento para intoxicação por fosforados: 1 – 2 mL de sulfato de atropina 1%, por via intramuscular. Procurar um Médico Veterinário

APRESENTAÇÃO:

Frasco aerossol contendo 200 e 500mL

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 5.198 em 02/08/95.