

APLONAL® 5 mg

Antiinflamatório, analgésico e antipirético

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA:

Cada comprimido de 300 mg contém:

Flunixina Meglumina (equivalente a 5 mg de Flunixina base).....	8,30 mg
Excipiente q.s.p	300,00 mg

PROPRIEDADES:

O princípio ativo de APLONAL® 5mg é a Flunixina Meglumina, um analgésico potente não esteróide e não narcótico, que apresenta propriedades antiinflamatórias e antipiréticas.

APLONAL® 5mg atua inibindo a síntese de prostaglandinas e tromboxanos, que são mediadores da dor e da inflamação, sintetizados a partir dos ácidos graxos liberados pelos tecidos injuriados.

INDICAÇÕES:

APLONAL® 5mg é indicado para cães de pequeno e médio porte no alívio da dor e da inflamação de qualquer origem, incluindo a dor músculo-esquelética, pós-traumática e pós-cirúrgica.

ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:

APLONAL® 5mg deve ser administrado por via oral na dose de 1 mg de Flunixina por kg de peso corpóreo, equivalente a 1 comprimido para cada 5 kg de peso, durante **no máximo** 3 dias consecutivos com intervalo de 24 horas entre as doses. Em casos crônicos, alternar 3 (três) dias de tratamento com 4 (quatro) dias sem medicação durante um período máximo de 3 (três) meses.

CONTRA-INDICAÇÕES:

APLONAL® 5mg é contra-indicado para felinos e fêmeas gestantes de qualquer espécie.

EFEITOS ADVERSOS:

Esporadicamente podem aparecer vômitos e diarréias. Nestes casos, suspender o tratamento.

PRECAUÇÕES:

Os estudos de toxicidade em cães evidenciaram um efeito tóxico gastrintestinal característico a todos os antiinflamatórios não esteróides. A dose máxima tolerável é de 2,2 mg/kg. Recomenda-se portanto respeitar as indicações de dose e duração do tratamento.

Não administrar em cães com distúrbios digestivos ou insuficiência renal.

Não administrar em caninos com perfusão renal diminuída (desidratação, hipotensão, etc).

Evitar associação com substâncias que apresentam toxicidade gastrintestinal ou renal.

Evitar o uso concomitante com corticosteróides ou outras drogas antiinflamatórias não esteróides pois potencializam os efeitos adversos gastrintestinais.

CONSERVAÇÃO:

Consevar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 e 35º C e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

APRESENTAÇÃO:

Blister com 12 comprimidos de 300,00 mg cada, acondicionados em cartucho.

Venda sob prescrição obrigatória e administração sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.869 em 15/04/99.