

## **APLONAL<sup>®</sup> 1%**

**Antiinflamatório – Analgésico – Antipirético Injetável para Cães**

USO VETERINÁRIO

### **FÓRMULA:**

Cada 100 mL contém:

Flunixinina meglumina (equivalente a 1 g de Flunixinina base).....1,60 g  
Veículo q.s.p.....100,00 mL

### **PROPRIEDADES:**

O princípio ativo de APLONAL<sup>®</sup> 1 % é a Flunixinina Meglumina, droga que possui ação antiinflamatória, analgésica e antipirética, não esteróide e não narcótica. Sua potente ação antiprostaglandina torna esta droga a de eleição para o alívio da dor de origem visceral, músculo-esquelética e oftálmica em cães.

### **INDICAÇÕES:**

APLONAL<sup>®</sup> 1 % é indicado para o alívio da dor e da inflamação em cães nos seguintes casos:

- Transtornos músculo-esquelético como: artrose, discopatias e miosites;
- Quadros inflamatórios agudos;
- Choque endotóxico;
- Dor pós-traumática e pós-cirúrgica;
- Oftalmologia: cirurgias oftálmicas, uveíte anterior, queratite e conjuntivite;
- Na parvovirose pode ser usado como tratamento de suporte.

### **ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA:**

Administrar 1 mg/kg, equivalente a 1 mL de APLONAL<sup>®</sup> 1%, para cada 10 kg de peso corpóreo por via intramuscular ou intravenosa, a cada 24 horas durante no máximo 3 dias.

### **CONTRA-INDICAÇÕES:**

Os estudos de toxicidade em cães evidenciaram um efeito tóxico gastrointestinal característico de todos os antiinflamatórios não esteróides. A dose máxima tolerável é de 2,2 mg/kg. Recomenda-se portanto, respeitar as indicações de dose e duração do tratamento. Não administrar em cães com distúrbios digestivos, insuficiência renal ou com perfusão renal diminuída (desidratação, hipertensão, etc).

### **EFEITOS ADVERSOS:**

Esporadicamente podem ocorrer vômitos e diarreia. Nestes casos, suspender o tratamento.

### **PRECAUÇÕES:**

Evitar a associação com substâncias que apresentam toxicidade gastrointestinal ou renal.

Não foi determinado o efeito de APLONAL<sup>®</sup> 1% em fêmeas prenhes. Recomenda-se portanto, evitar o uso da droga nestes animais ou empregar com máxima precaução.

Evitar o uso concomitante de corticosteróides e outras drogas antiinflamatórias não esteróides.

### **CONSERVAÇÃO:**

Conservar em local seco e fresco, a temperatura entre 4 e 35° C e ao abrigo da luz solar direta.

Manter fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.

### **APRESENTAÇÃO:**

Frasco ampola de vidro contendo 12 mL , acondicionados em cartucho individual

Venda sob prescrição obrigatória e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6.868 em 15/04/99.