

## COLEIRA TEA 327® CÃES E GATOS

Antiparasitário Externo - Antipulgas e Carrapatos

### USO VETERINÁRIO

#### FÓRMULA:

Cada 100 g contém:

Propoxur.....10,0 g  
Excipiente q.s.p.....100,0 g

A COLEIRA TEA 327 CÃES E GATOS é composta por uma matriz plástica autosaturada, com liberação controlada de pó inseticida, de ação específica em carrapatos e pulgas. Este dispositivo funciona 24 horas liberando micropartículas inseticidas em toda a superfície da coleira. Através do movimento do animal, as micropartículas espalham-se de maneira uniforme por todo o corpo, eliminando pulgas e carrapatos dos animais de estimação por um período aproximado de até 5 meses.

#### PROPRIEDADES:

- Ação residual prolongada (até 5 meses);
- Não perde a eficácia quando o animal se molha;
- De baixa toxicidade, pode ser usado em animais a partir de 6 semanas de vida.

#### INDICAÇÕES:

Prevenção e controle de pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus*), sensíveis a carbamatos, que infestam cães e gatos.

#### MODO DE USAR:

Ajuste a coleira no pescoço do animal de modo que não fique apertada, nem frouxa, permitindo a passagem de dois dedos por debaixo da mesma. Corte e descarte a parte excedente.

Verificar periodicamente o ajuste da coleira, especialmente em animais em crescimento. O ajuste excessivo pode causar irritação mecânica.

Retirar a coleira antes do banho e voltar a colocá-la quando o pêlo estiver seco.

Para alcançar uma proteção contínua, substituir a coleira quando esta perder a eficácia.

#### IMPORTANTE:

Para evitar reinfestações e controlar efetivamente as pulgas e carrapatos, convém tratar o ambiente onde vivem os cães e gatos (pisos, rodapés, estofados, etc.) usando produtos adequados para este fim, em conjunto com o uso da coleira.

#### CONTRA INDICAÇÕES:

Não utilizar em animais com idade inferior a 6 semanas.

É contra-indicado para animais que apresentem histórico de hipersensibilidade aos componentes do produto.

#### EFEITOS ADVERSOS:

Podem ocorrer reações alérgicas em animais hipersensíveis. Aos primeiros sintomas, retirar a coleira e banhar o animal com água em abundância. Se persistirem os sintomas procurar um Médico Veterinário e levar a embalagem do produto.

#### DURAÇÃO DO EFEITO:

O efeito pulguicida e carrapaticida dura até, aproximadamente, 5 meses.

A coleira não tem efeito repelente. As pulgas morrem após o contato com o princípio ativo. Os carrapatos por sua maior resistência podem demorar até 24 horas para morrerem. As formas imaturas também são afetadas.

O tempo de eficácia pode variar com a mobilidade do animal e com o nível de infestação. Quanto maior a mobilidade e o nível de infestação, menor o tempo de duração do efeito da coleira.

#### PRECAUÇÕES:

Produto tóxico – Não ingerir – Não beber, comer ou fumar durante sua manipulação; logo após lavar as mãos com sabão e água em abundância.

**Em caso de ingestão acidental provocar vômito e chamar o médico.**

**Sintomas de intoxicação:** enjôos, náuseas, dores de cabeça, espasmos intestinais, miose, dispnéia e sudorese.

**Advertência ao médico:** em caso acidente, aplicar o tratamento para carbamatos.

**Antídoto:** Sulfato de atropina á 1%, por via intramuscular.

**Centro de referência:** Hospital das Clínicas – Centro de Assistência Toxicológica (CEATOX) – Tel.: 0800 148110 – São Paulo/SP

**CONSERVAÇÃO:**

Conservar em local seco e fresco a temperatura entre 4°C e 35°C, ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**APRESENTAÇÕES:**

Coleira de 13g medindo 33 cm para gatos;

Coleira de 13 g medindo 33 cm para filhotes de cães e cães pequenos;

Coleira de 28g medindo 44 cm para cães de porte médio;

Coleira de 38g medindo 57 cm para cães grandes.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob n° 5.878 em 21/02/97.